



Cría de Pollitos (etapa de crianza)

Suministros

- ❑ Criadora (brooder): recipiente cerrado, del tamaño adecuado y sin corrientes de aire que mantenga a los pollitos seguros
- ❑ Placa térmica o fuente de calor
- ❑ Comedero
- ❑ Bebedero para pollitos (acceso a agua poco profunda)
- ❑ Alimento iniciador medicado de alta calidad para pollitos de 0 a 21 días (en migajas); alimento de crecimiento de 22 a 49 días
- ❑ Electrolitos
- ❑ Cama (papel, virutas de pino, etc.)

Criador

(un lugar seguro para los pollitos hasta que sean lo suficientemente grandes para trasladarse al gallinero)

- ❑ Ensámblala antes de recibir a los pollitos.
- ❑ Coloca una capa de cama.
 - ▶ El recipiente debe tener al menos 1 a 2 pies² (0.1–0.2 m²) de espacio por pollito y paredes de 12" (30.5 cm) para evitar que se escapen.
 - ▶ Se puede usar una capa de periódico o cartón para ayudar a mantener un ambiente más limpio.
- ❑ Placa térmica / fuente de calor: ajusta la altura para que los pollitos quepan cómodamente debajo.
 - ▶ Temperatura de la criadora: 95°F (35°C) en clima frío y 90°F (32°C) en clima caluroso; la temperatura ambiente debe estar entre 65–75°F (18–24°C).
 - ▶ En general, reduce la temperatura 5°F (3°C) cada semana hasta que los pollitos tengan 5 semanas; luego mantén la temperatura en 70°F (21°C).
- ❑ Agua
 - ▶ Coloca el bebedero en una superficie nivelada.
 - ▶ Se pueden agregar electrolitos al agua para ayudar a reducir el estrés del traslado y fortalecer su sistema inmunológico.
- ❑ Llena el comedero con alimento iniciador para pollitos.



Uso de una Placa Térmica

- ❑ Las placas térmicas se pueden ajustar según la altura de los pollitos.
- ❑ Si los pollitos están amontonados muy juntos, indica que tienen frío y se debe bajar la placa térmica.
- ❑ Si los pollitos están muy dispersos, se debe subir la placa térmica.
- ❑ A medida que los pollitos crecen y les comienzan a salir plumas, necesitan menos calor.

Cuidado de los Pollitos

- ❑ Los pollitos deben revisarse al menos dos veces al día durante las primeras dos semanas.
- ❑ Limpia la criadora y cambia las virutas de pino al menos una vez por semana.
 - Los pollitos necesitan un ambiente limpio para prevenir enfermedades.
- ❑ Asegúrate de que el agua esté fresca y limpia.
 - Colocar el bebedero sobre un pequeño bloque puede ayudar a mantener el agua limpia.
- ❑ Lávate las manos antes y después de limpiar la criadora o manipular los pollitos para evitar la transmisión de enfermedades.
- ❑ Los pollitos deben alimentarse con alimento iniciador durante las primeras 18 semanas y luego pasar a alimento para ponedoras, que tiene mayor contenido de calcio para apoyar la formación de huevos.
- ❑ Cuando los pollitos están completamente emplumados (alrededor de las 8 semanas), pueden trasladarse al gallinero.
 - Cada pollo necesita 3 pies² en el gallinero y 8 pies² en el corral (0.3–0.7 m²).



WEBSITE | convoy.org/cafs



EMAIL | cafsteam@convoyofhope.org



CONVOY OF HOPE

Center for
Agriculture &
Food Security